



Laboratoire BELILAB
Béthune Clinique
100 Boulevard Emile
Basly
62400 BETHUNE

Protocole de recueil pour SPERME

Ref : MU(B)-FOR-SEC-006-version
07

Applicable le : 20-10-2019



PROTOCOLE DE RECUEIL DE SPERME

INTÉRÊT :

Ce recueil s'effectue pour vérifier l'absence de bactéries pathogènes ou commensales de l'urètre distal qui peuvent altérer le potentiel fertile des spermatozoïdes, il peut être contributif dans le diagnostic étiologique des infections génitales hautes (spermoculture) et dans le cadre d'un bilan d'infertilité.

PRÉCONISATIONS POUR LE PRÉLÈVEMENT :

Cette analyse se fait soit au laboratoire, soit à domicile. Le prélèvement devra alors être transmis impérativement dans les 2 heures au laboratoire à température ambiante.

Le recueil doit être effectué après 2 jours d'abstinence au minimum et 5 jours au maximum.

Étapes du recueil :

- Hygiène soignée des mains
- Réaliser une miction
- Désinfection soignée du gland, du méat, du sillon balano-préputial et du prépuce avec un antiseptique
- Rinçage avec du sérum physiologique
- Ouvrir le flacon stérile et recueillir la totalité du sperme par masturbation (ne pas utiliser de préservatif).

Noter votre nom et prénom ainsi que l'heure du recueil sur l'étiquette du flacon.