



Le prélèvement est réalisé, si possible, au moins 4 heures après la miction précédente.

- Après un lavage hygiénique des mains.
- Faire une toilette intime soigneuse (savon/lingettes) d'un seul geste (de l'avant vers l'arrière pour les femmes).
- Éliminer le 1er jet d'urines dans les toilettes.
- Uriner ensuite dans le flacon stérile à **bouchon jaune** (ne pas toucher le bord supérieur du récipient). Ne pas uriner directement dans le tube avec conservateur à bouchon vert kaki.
- Fermer hermétiquement le flacon à bouchon jaune.
- Nettoyer l'extérieur et réaliser à nouveau un geste d'hygiène des mains.
- Remplir le tube bouchon vert kaki comme expliqué sur fiche jointe.



TRANSMISSION AU LABORATOIRE :

Si vous avez rempli le tube avec conservateur (bouchon vert kaki), transmettre les 2 flacons au laboratoire à température ambiante (délai de 12h maximum).

Si vous ne disposez pas de tube avec conservateur (bouchon vert kaki), alors transmettre le flacon immédiatement au laboratoire (délai de 2h maximum)

Si délai > 2 heures, conserver à + 4°C au frigo (délai de 12h maximum).

Compléter la fiche de transmission individuelle (recto).